

Agriculture 6th Class Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	جڑی بوٹیاں تلف کرنے کے جو مروجہ طریقے ہیں ان کی تعداد ہے	A. چھپے B. چار C. دو D. سلت
2	دائمی جڑی بوٹی ہے	A. گوڈی B. پوبلی C. نب D. بوگھٹ
3	کس جڑی بوٹی کی جڑی گھٹلی دار ہوتی ہیں	A. براگھاس B. میناکی C. اٹ سٹ D. ریواڑی کی
4	پودوں کو عمر کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے	A. ایک قسم B. دو قسم C. تین قسم D. چار قسم
5	ریواڑی جس فصل کی جڑی بوٹی ہے	A. مکئی کی B. چنے کی C. کھاس کی D. گندم کی
6	میدانی علاقوں کی مٹی عموماً ہوتی ہے	A. بنجر B. ریتی C. سخت D. زرخیز
7	جانوروں کو کتنی دفعہ صاف ستھرا پانی پلانا چاہیے	A. ایک B. دو C. تین D. چار
8	ہمارے ملک میں بھیڑوں کی جو نسلیں پائی جاتی ہیں ان کی تعداد ہے	A. 20 B. 30 C. 40 D. 50
9	عام طور پر زمین میں پانی کتنے فیصد ہوتا ہے	A. 5% B. 10% C. 15% D. 25%
10	زمین کے اندر پائے جانے والے ذرات کے درمیان موجود ہوتی ہے	A. کاربن B. آکسیجن C. ہوا D. نائٹروجن
11	جڑی بوٹیاں، کھجڑوں اور بیماریوں کی روک تھام کے عمل میں پیدا کرتی ہیں	A. تیزی B. رکاوٹ C. جوش D. نواتر
12	اس زمین سے بہتر پیداوار ہوتی ہے	A. ریتی زمین B. چکنی زمین C. میرا زمین D. ملی جلی زمین
13	کرہ ارض کو ہم نمائیل حصوں میں تقسیم کرتے ہیں	A. ایک B. دو C. تین D. چار
14	جڑی بوٹیوں کی تلفی میں جس چیز کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں	A. گھر B. کاشتکاری C. سفر D. سواری
15	کچھ پودے نمدار مقامات اور دلدلوں میں اگتے ہیں ایسے پودے کہلاتے ہیں	A. صحرائی پودے B. میدانی پودے C. آبی پودے D. جزوی بوٹیاں

16	ضرورت سے زیادہ پانی ملنے سے پودے کی جڑیں ہوجاتی ہیں	A. مضبوط B. پائیدار C. گل D. کوئی نہیں
17	کس جڑی بوٹی کے پودے کو دبانے سے ہرنگ پتی نمودار ہوتا ہے	A. پوبلی B. ریواڑی C. تکلہ D. جنگلی جنی
18	بھیڑوں کی نسل جو عام طور پر بغیر سینگ کے ہوتی ہے	A. وامانی بھیڑیں B. وزیری بھیڑیں C. آفریدی بھیڑیں D. پشت نگری بھیڑیں
19	ایسے پودے جو ایک ہی موسم میں اگتے ہیں کہلاتے ہیں	A. یک سالہ B. دو سالہ C. تین سالہ D. چار سالہ
20	دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے کس نسل کی بھیئس بہترین قرار دی گئی ہے	A. راوی B. نیلی C. نیلی راوی D. مڑا