Zari Taleem Urdu 7th Class Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	خرگوش کی اقسام ہیں	A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
2	بطخوں کی خوراک کے برتن پر پھپھوندی لگنے کی صورت میں کاپر سلفیٹ کا کتنے فیصد محلول تیار کرنا چاہیے.	A. 0.5 فیصد B. 1.5 فیصد C. 2.0 فیصد D. 2.5 فیصد
3	خرگوش کی خوراک کے فارمولا 3 میں مونگ پھلی کی کھلی کی مقدارہوتی ہے.	A. 5 فیصد B. 10 فیصد C. 15 فیصد D. 20 فیصد
4	انڈوں کو میز پر پھیلانے کے کتنے روز بعد ان سے چھوٹی چھوٹی سنڈیاں نکلنا شروع ہوجاتی ہی.	A. تین B. پانچ C. سات D. نو
5	بہترین دیسی کھاد بنانے کےلیے مویشیوں کے گوبر ،پتوں اور مرغیوں کے فضلے کو گڑھے میں دبانے رکھنا چاہیے.	A. ایک سے دو ماہ تک B. دو سے تین ماہ تک C. چھے سےآٹھ ماہ تک D. دس ماہ سے ایک سال تک
6	تیار شدہ کیاری یا گملے میں پھولوں کے بیج پر کیا ڈالنا چاہیے.	A. یوریا کھاد B. قدرتی کھاد C. امونیم سلفیٹ کھاد D. پتوں کی کھاد کی تہہ
7	آم کا سکوائش تیار کرنے کے لی رس ، پانی، چینی اور سٹرک ایسڈ ملاکر گرم کریں.	A. 50 سے 55 درجے سینٹی گریڈ B. 55 سے 66 درجے سینٹی گریڈ C. 65 سے 75 سینٹی گریڈ D. 75 سے 85 سینٹی گریڈ
8	ایک مادہ خرگوش کو اپنے بچوں کے ساتھ جگہ درکار ہوتی ہے.	A. دو مربع فٹ B. چار مربع فٹ C. آٹھ مربع فٹ D. چھے مربع فٹ
9	ٹیوبر کو عام طور پر کس موسم میں لگایاجاتا ہے.	A. ساون کے مہینے میں B. بہار کے شروع میں C. خزاں کے آغاز میں D. بہار گزرنے کے بعد
10	فارمولا 3 میں خشک برسیم کا چورا ہوتا ہے.	A. 10 فیصد B. 20 فیصد C. 30 فیصد D. 40 فیصد
11	ریشم کی اچھی پیداوار کے لیے انکے کیڑوں کو درکار ہوتی ہے.	A. 70 تا 80 ڈگری فارن ہائیٹ B. 80 تا 90 ڈگری فارن ہائیٹ C. 70 تا 90 ڈگری فارن ہائیٹ D. 60 تا 70 ڈگری فارن ہائیٹ
12	خرگوش کی خوراک میں شامل نہیں ہونا چاہیے.	A. روٹی B. گوشت C. خشک بھوسہ D. سبز چارہ
13	بلیک مینار کا مرغی کا اوسط وزن ہوتا ہے.	A. ڈیڑھ کلو B. دو کلو C. اڑھائی کلو D. تین کلو
14	پیلیگن قسم کے خرگوش وزنی ہوتےہیں.	A. 10 کلوگرام تک B. 12 کلوگرام تک C. 14 کلوگرام تک D. 15 کلوگرام تک
15	رس نکالنے سے پہلے پھل کو محلول سے دھولینا چاہیے.	A. میگنیشم B. پوٹاشیم پر میگنیٹ C. سوڈیم D. امونیم

16	فارمولا 4 میں سفارش کردہ خشک لوسن کی مقدار ہوتی ہے.	A. 15 فیصد B. 45 فیصد C. 60 فیصد D. 40 فیصد
17	پودے کے قلم کی لمبائی ہونی چاہیے.	A. دس میٹر B. دس سینٹی میٹر C. تیس سینٹی میٹر D. سترہ سینٹی میٹر
18	رنگ دار سکوائش کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں.	A. سوڈیم کاربونیٹ B. سوڈیم بینزونیٹ C. سوڈیم کلورائیڈ D. سوڈیم بائی کاربونیٹ
19	آلو کے بجائی کے وقت امونیم نائٹریٹ کی مقدار فی ایکڑ کیا ہے.	A. ایک بوری B. دو بوری C. تین بوری D. چار بوری
20	کیاری میں بونے کے بعد کتنے دن کے بعدبیج پھوٹ نکلتے ہیں.	A. تین دن B. ایک ہفتے C. دس دن D. دو ہفتے