

Energetics

Sr	Questions	Answers Choice
1	شروع میں عمل تبخیر کی شرح جس سے زیادہ ہوتی ہے	A. تبخیر B. کٹن سیشن C. دباؤ D. ویپر پریشر
2	مادہ کی حالتیں ہیں ؟	A. دو B. تین C. چار D. پانچ
3	جس کا قانون والیوم اور پریشر کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے	A. ڈالٹن B. چارلس C. گراہم D. بوائل
4	زیادہ اونچائی پر فضا میں آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے	A. کم B. زیادہ C. مستقل D. کوئی نہیں
5	گریفائٹ میں ہر کاربن جتنے کاربن ایٹم سے دوسروں سے ملا ہوتا ہے	A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
6	نفوذ کا عمل جس میں ہوتا ہے	A. مانع B. ٹھوس C. گیس D. اے اور سی
7	جب دباؤ ڈالا جائے تو	A. تو گیس کے مالیکیولز قریب قریب آجاتے ہیں B. اس کا حجم ہو جاتا ہے C. خالی جگہوں کی وجہ سے مالیکیولز پاس آجاتے ہیں D. تمام
8	مادے کی طبعی حالتیں ہیں	A. 5 B. 3 C. 2 D. 4
9	گیس کا والیوم جس کا والیوم ہوتا ہے	A. برتن B. مالیکیولز C. اے اور بی D. ایٹمز
10	ایویپوریشن میں جو مالیکیولز مانع کی سطح کو چھوڑتے ہیں ان میں ہوتی ہے	A. بہت کم انرجی B. درمیانی انرجی C. بہت زیادہ انرجی D. ان میں سے کوئی نہیں
11	عمل تبخیر سے پیدا ہوتی ہے	A. گرمی B. مرطوبیت C. ٹینک D. کوئی بھی نہیں
12	کاربن کی بیرونی اشکال کو جتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے	A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
13	گیسز مادہ کی ہلکی ترین حالت ہیں اور ان کی ڈینسٹیٹی کو کن میں ظاہر کیا جاتا ہے	A. mgcm-3 B. gcm-3 C. kgdm-3 D. gdm-3
14	ٹھوس میں ایک خاص ترتیب جس وجہ سے ہوتی ہے	A. لیٹس B. کرسٹل لیٹس C. اے اور بی D. کوئی نہیں
15	جس کو آسانی سے دبا دیا جا سکتا ہے	A. مانع B. ٹھوس C. گیس D. اے اور سی

		پلازما D.
16	ٹمبریجر بڑھنے سے بڑھتا ہے	A. ایٹموسفیر پریشر B. وینر پریشر C. K.E D. بی اور سی
17	ٹھوس پارٹیکلز میں سے کون سی موشن پائی جاتی ہے	A. رونیٹنل موشن B. وائبریشنل موشن C. ٹرانسلیشنل موشن D. ٹرانسلیشنل اور وائبریشنل موشن دونوں
18	نفوذ کی شرح کا انحصار جس پر ہے	A. ایٹمی نمبر B. گرام ایٹمی ماس C. ایٹمی ماس D. گرام مالیکیول ماس
19	مائع کے درجہ حرارت کے کم ہونے کی وجہ سے	A. فریزنگ B. کولنگ C. بوائلنگ D. میلتنگ
20	مائع کی ڈینسٹی ٹھوس سے جس وجہ سے کم ہوتی ہے	A. انٹر مالیکیولر فورسز B. درجہ حرارت C. M.P D. والیوم