

نقصان دہ کیڑوں کا مطالعہ

(STUDY OF INSECT - PESTS)

پاکستان میں ہر سال فصلوں، پانوں اور اجناس کے ذخیروں کو مختلف قسم کے کیڑے اور بیماریاں بے پناہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ نقصان دو سو کروڑ روپے کے لگ بھگ پہنچ جاتا ہے، جو قومی اور ملکی نقصان ہے۔ کاشتکاروں کو صرف فصلیں اگانے اور کاٹنے تک ہی اپنی سرگرمیاں محدود نہیں کرنی چاہیں بلکہ ان کی حفاظت اور دیکھ بھال بھی کرنا چاہیے تاکہ ان میں کوئی فصلی بیماری یا کیڑے مکوڑے حملہ آور نہ ہوں۔ اگر کیڑے مکوڑے فصلوں پر حملہ آور ہو جائیں تو زراعت خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ لہذا ایک ذہین زمیندار یا کاشتکار کو ان کیڑے مکوڑوں کی اقسام اور ان کی پرورش میں مداخلت کا بخوبی واقف ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر اسے اتفاقی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیڑے مکوڑوں کے تدارک کیلئے مختلف طریقہ ہائے انداد کو بروئے کار لایا جائے تو فصلیں کیڑے مکوڑوں سے پیدا ہونے والے نقصان سے بچ سکتی ہیں۔

کیڑوں کی اقسام

کیڑوں کو ان کے پروں اور منہ کے اعضاء کی بناوٹ کے لحاظ سے سلت گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

1- سیدھے پر والے کیڑے

ان کے پروں کے دو جوڑے ہوتے ہیں۔ ایک جوڑا آگے اور ایک جوڑا پیچھے۔ اگلا جوڑا تنگ اور سیدھے کناروں والا اور

رنگدار ہوتا ہے۔ پروں کا دوسرا جوڑا جلیدار ہوتا ہے۔ بیٹھے وقت پروں کا دوسرا جوڑا پہلے جوڑے کے نیچے چھپا رہتا ہے کیونکہ یہ پر پہلے جوڑے سے چوڑے ہوتے ہیں۔

ایسے کیڑوں کا دور زندگی تین حالتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی انڈا، ناکمل مڈا اور مکمل مڈا۔
مثلاً: آگ کا مڈا، ٹوکا وغیرہ۔

2۔ جالی دار پر والے کیڑے

ان کیڑوں کے پروں کے بھی دو جوڑے ہوتے ہیں۔ دونوں پروں کے جوڑے قد میں برابر اور جالی دار ہوتے ہیں۔
اس قسم کے بعض کیڑوں میں دور زندگی کی چار حالتیں اور بعض کیڑوں میں تین حالتیں ہوتی ہیں۔
مثلاً: تیتلا، دیک وغیرہ۔

3۔ نصف پر والے کیڑے

ایسے کیڑوں کے پروں کے دو جوڑے ہوتے ہیں۔ اگلے جوڑے کے پردیکھنے میں آدھے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ پروں کے لوپر کا حصہ سخت ہوتا ہے اور پچھلا حصہ جالی دار ایسے کیڑوں کے منہ کاٹنے کی بجائے چوسنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ کیڑے پودوں پر بیٹھ کر ان میں اپنی باریک سونڈ سے شگاف کر کے ان کا اندرونی رس چوس لیتے ہیں۔ ان کیڑوں کے دور زندگی کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔
مثلاً: کھنسل وغیرہ۔

4۔ جھلی دار پر والے کیڑے

ان کیڑوں کے پروں کے بھی دو جوڑے ہوتے ہیں۔ پروں کا اگلا جوڑا دوسرے سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ پروں کے ان دونوں جوڑوں پر چند لکیریں ہوتی ہیں۔ یہ کاٹنے والے کیڑے ہوتے ہیں۔ کاٹنے کے بعد پودے کو چاٹتے ہیں۔
ان کیڑوں میں دور زندگی کی چار حالتیں ہوتی ہیں یعنی انڈا، کرم، پیوپا اور مکمل کیڑا۔
مثلاً: بھڑ، چونیل اور مکوڑے وغیرہ۔

5- سخت پروالے کیڑے

سخت پروالے کیڑوں کے بھی پروں کے دو جوڑے ہوتے ہیں۔ پروں کا اگلا جوڑا سخت ہوتا ہے جو بدن کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ پروں کا دوسرا جوڑا ہلکے قد کا اور جلی دار ہوتا ہے جو اڑنے میں کام آتا ہے۔ جب کیڑا بیضا ہو تو پچھلا جوڑا پہلے جوڑے کے نیچے چھپا رہتا ہے۔

ان کیڑوں کی زندگی کا دور بھی چار حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ سری، ٹینگن کی بھونڈی اس گروہ میں شامل ہیں۔

6- بردار پروالے کیڑے

بردار پروالے کیڑوں کے پروں کے دو جوڑے برابر قد کے ہوتے ہیں۔ ان کے پروں پر رنگ برنگ کا غبار ہوتا ہے۔ ان کیڑوں کا دور زندگی چار حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ انڈوں سے نکلنے ہی جب دوسری حالت میں آتے ہیں تو کھانا شروع کرتے ہیں اور کھانے کا عمل صرف اسی حالت میں کرتے ہیں۔ کھانا کٹ کر کھاتے ہیں۔ چوتھی حالت میں کیڑا مکمل ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں منہ کاٹنے کی بجائی چوسنے والا ہو جاتا ہے ایک قدرے لمبی سونڈ کے ذریعے پھولوں کے اندر سے رس چوستے ہیں۔ یہ سونڈ آرام کی حالت میں جھج جھج ہوتی ہے۔

مثلاً: کہاس کی سنڈی اور پروانے وغیرہ۔

7- دو پروالے کیڑے

ان کیڑوں میں پروں کا صرف اگلا جوڑا ہی ہوتا ہے۔ یہ اپنی خوراک کاٹ کر نہیں کھا سکتے بلکہ چوستے ہیں۔ ان میں سے بعض کیڑوں کے اعضاء سوئی جیسے تیز ہوتے ہیں۔ ان کو انسان یا حیوان کے جسم یا پودوں کی پھل کے اندر چھو کر خون یا رس چوستے ہیں مثلاً پھرجند کیڑے ایسے ہیں جن کی چوسنے والی سونڈ تو موجود ہوتی ہے لیکن وہ نرم ہونے کے باعث جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ مثلاً گھریلو مکھی۔

(I) اہم فصلوں کے نقصان دہ کیڑوں کی پہچان اور ان کا انسداد

(Familiarization with Insect-Pests of Major crops & their Preventive Measures)

اہم فصلوں کے نقصان دہ کیڑے

1	گندم	گلابی سنڈی، تنے کی مکھی، دیمک، ٹوٹک
2	چاول	تنے کی سنڈی، ڈایا ٹوٹک، سیڈ بگ
3	گنا	چوٹی کاگزواں، تنے کاگزواں، جز کاگزواں، گرد اسپوری گزواں، مکلا کی سفید مکھی، مکلا کی سرخ مکھی
4	کپاس	جھنکیری سنڈی، گلابی سنڈی، پتاپٹ سنڈی، سبز نیلہ، ٹوٹک، سفید نیلہ
5	تمباکو	نیلہ، ٹھکوفہ خور سنڈی، تمباکو کی سنڈی، کبڑی سنڈی، چور سنڈی، تنے کی سنڈی
6	مکئی	تنے کاگزواں، بھنے کی سنڈی
7	باجرو	بھنے کی سنڈی، دیمک
8	چنا	چنے کی ناڑ کی سنڈی، چور سنڈی

1- بگ

یہ پتلا اور لمبا کیڑا ہوتا ہے۔ جو دامن کوہ کے علاقوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ دن رات خصوصاً آلو کے پتوں سے رس چوس کر پودوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ٹینڈوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ پودوں کی شاخیں لمبی ہو کر بدو وضع ہو جاتی ہیں۔

فصل پر بی ایچ سی کا 5 فیصد سفوف 450 لٹر پانی میں ملا کر اسپرے کر لیں۔

انسداد: 1 پونڈ میلا تھیان 100 گیلن پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔

یا 8 اونس ڈائیمیکرون 100 گیلن پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔

2- بھٹے کی سنڈی

یہ سنڈی مکئی کے بھٹے پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اور خصوصاً "بھٹوں کے سرے بطور خوراک استعمال کرتی ہے۔ جس وقت نرم بھٹے بن جائیں تو اس وقت یہ دانوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بھٹے کے اوپر کے پردوں کو بھی کھانا شروع کر دیتی ہے۔ وسط گرمیوں میں انڈے سے پٹنے تک کی حالت میں تبدیلی کیلئے تیس دن لگتے ہیں۔ ایک بھٹے میں ایک ہی سنڈی اس کو مکمل طور پر خراب کر دینے کیلئے کافی ہوتی ہے۔ انسداد:- جوں ہی سنڈی کا حملہ شروع ہو فصل پر ڈپز کس 400 گرام 450 لیٹر پانی میں ملا کر پیرے کریں۔

3- پتہ پلیٹ سنڈی

پروانہ زردی مائل سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ سنڈی کا رنگ شروع میں قدرے زرد اور بعد میں ہلکا سبز ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں کپاس کی فصل پر انڈے دیتی ہیں۔ انڈے نازک چوں کی مچلی سطح پر دیتی ہیں۔ سنڈی ایک ہفتہ کے اندر نکل آتی ہے۔ یہ سنڈیاں اپنے ارد گرد پتہ پلیٹ کر اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہیں۔ جس سے فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ شدت کی صورت میں بے شمار سنڈیاں چوں سے چٹنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کپاس کے علاوہ یہ کیڑا بھنڈی پر بھی ملتا ہے۔ انسداد:- اینڈرین 19 لوٹس ڈیڑھ پونڈ 75 فیصد ڈی ڈی ٹی میں ملا کر اسپرے کریں۔

4- تنے کی سنڈی

تنے کی سنڈی کے بچوں کا رنگ زردی مائل سفید ہوتا ہے۔ سر کا رنگ نارنجی مائل بھورا ہوتا ہے۔ پروانے کا رنگ زرد بھورا ہوتا ہے۔ پروں کا رنگ ٹنک کھاس کی طرح ہوتا ہے۔ اگلے پروں کے سرے گول ہوتے ہیں۔ پروں پر دندانے دار لکیر بھی نظر آتی ہے۔ مادہ کی دم پر باریک بالوں کا گچھا ہوتا ہے۔ مادہ رات کے وقت چوں کی مچلی سطح کے نیچے چھوں کی

شکل میں سفید انڈے دیتی ہے۔ جو بعد میں سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ شدید سردی کے موسم میں فصل کی مڈھوں میں چھپی رہتی ہے۔

سندھیاں تنے میں داخل ہو کر اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اور پودا سوکھ جاتا ہے۔ نئے سفید پڑ جاتے ہیں اور اس میں بالکل نہیں ہوتے۔ یہ مکئی کی فصل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔

انسداد:- کھیتوں میں ہل چلا کر مڈھوں کو اکھیڑ کر جمع کر لیا جائے اور جلا دیں۔ ایکسٹن یا میٹا تھیان 10 لوٹس 100 گیلن پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔ دھان کی پھیری پر چار مرتبہ اینڈرین 300 گرام، 450 لیٹر پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔

5۔ تھرپ

یہ جوڑوں کی طرح چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے۔ اس کا سائز تقریباً ایک ملی میٹر ہوتا ہے۔ اور رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ یہ کیڑے پتوں کی پھلی سطح پر جالا سا بنا دیتے ہیں اور اسے چوس کر پتے کی رنگت زرد کر دیتی ہیں۔ مادہ پتوں کی رگوں میں انڈے دیتی ہے۔ جن سے ایک ہفتہ کے بعد انڈے نکل آتے ہیں۔ شدید سردی میں زیر زمین رہتا ہے۔

تھرپ کا حملہ عموماً چھوٹے اور نازک پودوں پر ہوتا ہے۔ کیڑے پورے کھرج کھرج کر کھا جاتے ہیں متاثرہ پتوں کی پھلی سطح پر سفید جھلی نظر آتی ہے۔ یہ جھلی چاندی کی طرح چمکتی ہے۔ جھلی پر کالے داغ نمایاں طور پر نظر آئے ہیں شدید حملہ کی صورت میں پتوں کا سبز مادہ باقی نہیں رہتا اور پتے سفید بلکہ بد رنگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ پھولوں کو بھی شدید نقصان پہنچاتے ہیں اس کیڑے کا حملہ مارچ اپریل میں شدید ہوتا ہے۔

انسداد:- ڈائمیٹران 15 لوٹس فی ایکڑ اسپرے کریں۔ یا بی ایچ سی (12 فیصد) بشرح 4 پونڈ فی ایکڑ راکھ میں ملا کر دھوڑا کریں۔

قوت مدافعت برقرار رکھنے کے لئے فصل کو متوازن غذائیت بہم پہنچائیں۔

تیلانیت چھوٹے سے قد کا رس چوسنے والا کیزا ہے۔ یہ مختلف رنگوں 'سبز' زرد یا سیاہ میں پلایا جاتا ہے۔ ہلکے سبز رنگ کے پھد کٹے والے کیزے عموماً میدانی علاقے میں سال بھر نظر آتے ہیں۔ یہ پہاڑی علاقوں میں عموماً موسم گرما میں نظر آتے ہیں۔ فضا میں نمی زیادہ ہونے پر یہ کیزا بہت بڑھتا ہے۔ مختلف فصلوں کو مختلف قسم کا تیل لگتا ہے۔

خٹک سالی میں تیل زیادہ تعداد میں ہوتا ہے۔ بارش ہو جائے تو اس سے مر جاتا ہے اگر تیل پھلیوں پر لگ جائے تو پھلی کے اندر بیج بہت ہلکا رہ جاتا ہے۔ لور اگر پودے کے شکوفے پر لگ جائے تو پودا مر جاتا ہے۔ اس سے متاثرہ پتے کمزور اور کھردرے ہو جاتے ہیں۔ پتوں پر سرفی مائل بھورے داغ پڑ جاتے ہیں۔ پتوں کے کنارے نیچے کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ جب فصل 4 سے 6 پتوں پر مشتمل ہوتی ہے تو اس وقت عموماً تیل کا حملہ ہوتا ہے۔

انسداد:- حملہ شدہ پتوں کو توڑ کر جلا دینا چاہیے۔

اندرین 20 فیصد بشری 10 لونس 50 گیلن پانی ملا کر فی ایکڑ اسپرے کریں۔ یا ڈائمیٹران 6 سے 8 لونس 100 گیلن پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔ یا فصل پر بی ایچ سی 1 کلو گرام 450 لیٹر پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔ یا 400 گرام میلا تھیان 450 لیٹر پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔ اس عمل کو 4 مرتبہ دہرائیں۔

7- ٹڈا یا ٹوکا

یہ کیزا موسم ربيع اور موسم خریف کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔

اس کی دو مشہور قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے ٹڈے چھدکتے ہیں اور دوسری قسم کے ٹڈے 40 سے 60 میٹر تک ایک ہی وقت میں اڑ سکتے ہیں۔ دونوں کا رنگ ہلکا بھورا یا خیالا ہوتا ہے۔ یہ خٹک اور گرم آب و ہوا میں خوب نشوونما پاتے ہیں۔ صبح کی نسبت دوپہر کو زیادہ اڑتے ہیں۔

ٹڈا ایسا ضرر رساں کیزا ہے جو فصل کو اگتے ہی اوپر سے کاٹ دیتا ہے۔ اگیتی فصل کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اکثر پتوں اور ٹڈے والی شاخوں کو کھا کر نقصان کرتا ہے۔ ٹڈے کی مادہ زمین کے اندر موسم خزاں کے شروع میں 200 سے 300 تک

لبوترے چاول کی مانند انڈے دیتی ہے۔

ان انڈوں سے - درمیں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری نسل اگست کے آخر میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ بچے ڈیڑھ ماہ کے اندر مکمل انڈے بن جاتے ہیں۔ مکمل انڈا تقریباً 2.5 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔

انڈو:- فصل بونے سے پہلے کھیتوں میں سے تمام جڑی بوٹیوں کو صاف کر کے ان میں پی ایچ سی ایک کلو گرام 50 کلو گرام گندم کے چھان میں ملا کر بطور زہریلا طعمہ بکھیر دیں۔

یا 10 فیصد سیون ڈسٹ 20 پونڈ فی ایکڑ دھوڑا کریں۔

8- چنکبری دھبے دار سنڈی

سنڈی کا رنگ عام طور پر شروع میں سفید یا سرمئی ہوتا ہے بڑی عمر والی سنڈیوں پر سیاہ دھبے ہوتے ہیں سینے کے اگلے حصے پر نارنجی رنگ کے نشان ہوتے ہیں۔ باقی حصے پر ہلکے ہلکے پل ہوتے ہیں کیرے کے مکمل ہونے پر اگلے پر سفیدی مائل زرد ہوتے ہیں۔ جن پر سبز رنگ کی دھاری ہوتی ہے۔ مکمل سبز رنگ کی بھی سنڈی ملتی ہے۔ پروانے کا سر اور کوہن گمرے سبز رنگ کے ہوتے ہیں ماہ 200 سے 400 نیلگون سبز رنگ کے انڈے فصل کے پتوں یا غنچوں پر دیتی ہے۔ گرمی کے موسم میں تین چار دن بعد انڈے میں سے سنڈی نکل آتی ہے۔ سنڈی دس بارہ دن کے بعد کو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے ان سے آٹھ دس دن بعد پروانے نمودار ہو جاتے ہیں۔

یہ سنڈیاں موسم سرما میں گزشتہ فصل کے بچے کھجے پودوں پر وقت گزرنے کے بعد نئی فصل کے پھول آنے پر انڈے دیتی ہیں۔ پھر نئی سنڈیاں ٹینڈوں میں گھس کر ان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ٹینڈوں کے علاوہ پھول اور پتوں کے کنارے کٹ کٹ کر کھا جاتی ہے۔ اس سنڈی کا جولائی سے ستمبر تک شدید حملہ ہوتا ہے۔

انڈو:- اینڈرٹن 19 لونس ڈیڑھ پونڈ 75 فیصد ڈی ڈی ٹی میں ملا کر اسپرے کریں جب ٹینڈے اور ڈوڈیوں پر سنڈیوں کا حملہ ہو تو حملہ شدہ ٹینڈے اور ڈوڈیاں کٹ کر زمین میں دبا دیں۔

9- چنے کا بھورا

اس پر دار کیرے کا رنگ گہرا بھورا ہوتا ہے پیٹ کا سرانگہ موٹھیں لمبی دندانہ دار اور جسم خوب گھٹا ہوا ہوتا ہے۔ مادہ 100 کے قریب انڈے دیتی ہے۔ جن سے 10 سے 12 دنوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔

گرب کا رنگ میلا سفید ہوتا ہے۔ گویا کا رنگ شروع میں میلا سفید اور بعد میں بھورا ہو جاتا ہے۔



جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ کیرا چنے کا خاص طور پر دشمن ہے۔ والوں خصوصاً مونگ، ارہر، ماش، لوبیا اور مٹر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ چری اور مکئی بھی اس کی زد میں آتے ہیں۔ اس کے حملہ شدہ دانوں پر ایک یا ایک سے زیادہ باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں۔ اور دانے اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔

10- چور کیرا

یہ سیاہی مائل بھورے رنگ کا 12 سے 15 ملی میٹر لمبا کیرا میدانی علاقوں میں فروری اور مارچ (موسم بہار) میں نمودار ہوتا ہے۔ اس کے سر اور سینے کا رنگ بھورا ہوتا ہے۔ پروں پر چوڑے رخ دو سیاہ رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ دن کے وقت زمین کے اندر چھپ جاتا ہے۔ کٹے ہوئے پودوں کے آس پاس زمین کو کھدنے سے اکثر یہ کیرا مل جاتا ہے۔ یہ ننھے پودوں کے تنوں پر زمین کے قریب حملہ کرتا ہے۔ اور ان کو یا تو بالکل کاٹ دیتا ہے۔ یا اتنا زخمی کر دیتا ہے کہ وہ پودے کو پوری طرح خوراک نہیں پہنچا سکتے۔ اس طرح پودے مرجھا کر سوکھ جاتے ہیں۔ اور اگلے روز یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی

نے پودے قطار میں جڑ سے کٹ دیے ہیں۔ چور کیڑے پودوں کو کھاتے کم ہیں مگر پودوں کو کٹ کر نقصان زیادہ کرتے ہیں۔ مادہ پتھوں کی شکل میں گول زردی مائل سفید لٹھے دیتی ہے۔ جن سے ہفتہ دو ہفتے کے دوران بچے نکل آتے ہیں۔



انداوہ۔ روشنی کے پھندے لگا کر پودانوں کو تلف کر دیں۔

اگر چور کیڑے کا حملہ ہو تو فوراً پودوں کی جڑوں کے ساتھ ساتھ انڈرین کا سپرے کریں۔

ایگرو سائیڈ (7) کو لکڑی کی راکھ میں ملا کر پودوں کی جڑوں کے ارد گرد دھوڑا کرنے سے بھی چور کیڑا مر جاتا ہے یا 10 فیصد سیون ڈسٹ 20 پونڈ فی ایکڑ کے حساب سے اسپرے کریں۔

11- دھان کا پتنگا

اس پر دار کیڑے کا رنگ بھورا اور پروں کے کناروں کے ساتھ باریک جھلر ہوتی ہے۔ سنڈی کا رنگ سفید اور سر زردی مائل ہوتا ہے۔



دھان کا پتنگا

دھان 'آٹا' میڈہ اور سوچی کے علاوہ تمام قسم کے ذخیرہ شدہ اجناس کو بھی دھان کا پتنگا نقصان پہنچاتا ہے۔

سنڈی دانوں پر جلا بن کر اس کے اندر چھپ جاتی ہے۔ دانوں کے اندر سوراخ کر کے کھاتی جاتی ہے مگر دانے کی ظاہری حالت جوں کی توں رہتی ہے۔

12- دھان کی بھونڈی

یہ پتلا سا سبز رنگ کا کیزا ہوتا ہے۔ اگرچہ بہت سی اجناس مثلاً کھجی، منفل باجرہ پر حملہ کرتا ہے۔ تاہم دھان کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اسی کا مشہور دشمن ہے۔ یہ مٹے کی ڈنڈی اور دانوں میں سورخ کر کے ان کا رس چوس لیتا ہے۔ جس سے بٹے پیلے یا سفید ہو جاتے ہیں۔ دانے اچھی طرح نہیں بھر پاتے اور پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگیتی اقسام میں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔

انسدادیہ: چونکہ یہ کیزا مختلف جنگلی گھاسوں پر گزارہ کر سکتا ہے۔ اس لئے اس کا انسداد بہت مشکل ہوتا ہے۔ تاہم مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنے سے فصل کو کافی حد تک بچایا جاسکتا ہے۔

- 1- کیزے دستی جال سے پکڑ کر تباہ کر دیئے جائیں۔
- 2- کیزے سڑے ہوئے گوشت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس لئے گوشت کو ذہر لگا کر کھیت میں مختلف جگہوں پر لٹکا دیا جائے تو بہت سے کیزے تباہ کئے جاسکتے ہیں۔
- 3- ایک ایکڑ کے لئے دس پندرہ پونڈ بی۔ ایچ۔ سی۔ کا دھوا دینے سے بہت سے کیزے ہلاک ہو جاتے ہیں۔

13- دیمک

یہ ایک چوہنی کی مانند چھوٹی سی زرد اور سفید رنگ کی سنڈی ہوتی ہے۔ جو زمین دوز گھروں میں رہتی ہے جو سطح زمین سے تقریباً ایک میٹر سے بھی گہرے ہوتے ہیں۔ اس کا خاندان رانی، بادشاہ، کارکن، محافظ اور معلومین پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پودے کی جڑ کو کھا جاتی ہے۔ جس سے پودے خشک ہو جاتے ہیں۔ پودا پہلے پیلا اور بعد میں خشک ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف پودوں مثلاً کپاس، گندم اور چری کی جڑوں پر حملہ کرتی ہے۔

پودے کو اکھیر کر دیکھا جائے تو حملہ آور حصہ میں دیمک نظر آتی ہے۔

عموماً بارانی علاقے میں دیمک کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات کھیت کے کھیت تباہ ہو جاتے ہیں۔ گندم کی فصل کا نقصان اکتوبر سے جنوری تک کرتی ہے۔ دیمک کی ایک رانی تقریباً 75 ہزار انڈے دیتی ہے۔ جن سے ایک ہفتہ

وجہ سے اسے کپاس کا لال کیزا کہا جاتا ہے۔

انسداد:- کپاس کے پودوں کو جھٹکا دے کر کیزے کو زمین پر گرا دیں اور پھر تلف کر دیں۔

16- کپاس کی سونڈی

یہ کپاس کے پودے کی کونپلوں، پھولوں اور پھلوں کو کھاتی ہے۔ بعض دفعہ پیداوار نصف رہ جاتی ہے۔ یہ کیزا جولائی سے ستمبر تک کپاس کے پودوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔

ماہ نیلے رنگ کے تقریباً 250 انڈے منہ منہ کونپلوں پر دیتی ہے۔ تین چار روز کے بعد سیاہ رنگ کی سونڈیاں انڈوں سے نکل آتی ہیں جو فوراً کونپل کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ دو چار روز کے بعد یہ سونڈیاں ذرا بڑی ہو جاتی ہیں تو پھلوں میں سوراخ کر کے ان کے اندر گھس جاتی ہیں۔ اور نرم نرم بیج کھا کر کپاس کا ڈوڈہ اپنے فضلے سے خراب کر دیتی ہیں۔ تقریباً تین ہفتے سونڈی کپاس کے ڈوڈوں کو کھاتی رہتی ہے۔ بعد میں سونڈی ڈوڈے سے باہر نکل کر اپنے اوپر پردہ (کویا) تان لیتی ہے اور ایک ہفتہ آرام کرتی ہے۔ پھر مکمل سبز پروں والا کیزا پردے کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ یہ کیزا شام کے وقت کپاس کے کھیتوں میں اڑتا پھرتا ہے۔

انسداد:- جب کپاس کی سونڈی کا حملہ کپاس کے پودے کے شگوفوں تک ہو تو شگوفے کاٹ دیں اور سونڈی کو علیحدہ کر کے جلا دیا جائے۔

کپاس کی فصل کی برداشت کے بعد کپاس کی سونڈی بھنڈی توری کے پودوں پر گزارہ کرتی ہے۔ لہذا کپاس کے کھیت کے قریب بھنڈی توری کاشت نہ کی جائے۔

17- کپاس کے تنے کی سونڈی

اس کے انڈے زردی مائل ہوتے ہیں۔ ان انڈوں سے چند روز میں سونڈیاں نمودار ہوتی ہیں۔ جو پودے کے اندر داخل ہو کر اسے اوپر سے نیچے کی طرف کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ جس سے پودا مر جاتا ہے۔ اور پلانا خر خشک ہو کر گر پڑتا ہے۔

سنڈی کارنگ زردی مائل سفید ہوتا ہے اور تقریباً ساڑھے چار سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اس کا بدن چمکا ہوتا ہے۔ بدن کا انکلا حصہ دھچکلے حصے کی نسبت چوڑا ہوتا ہے۔

انسداد:- مرحضائے ہوئے کپاس کے پتوں کو کاٹ کر جلا دینا چاہیے کپاس کی فصل کے ٹڈیوں کو فصل کی برداشت کے بعد جلا دیں۔

18- کھیرا

یہ پردار کیزا ہوتا ہے۔ قد چھوٹا اور رنگ گہرا بھورا ہوتا ہے سر اندر کو کچھا ہوتا ہے۔ زیادہ سے قد میں چھوٹا اور رنگت میں زیادہ گہرا بھورا ہوتا ہے۔

گرب کارنگ سرخی مائل بھورا اور جسم پر لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ یہی گرب اجناس کے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ کویا کارنگ شروع میں زردی مائل سفید اور بعد میں گہرا بھورا ہو جاتا ہے۔

کھیرا دانے کے اندر گھس کر گودا کھا جاتا ہے اور دانے کا خول باقی رہ جاتا ہے۔

کھیرا ذخیرہ شدہ اجناس کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ گندم کا بدترین دشمن ہے۔ کئی 'چاول' 'پنے' جو اور جوار کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں یہ پلانا نہ جاتا ہو۔ میدانی علاقوں میں اور خصوصاً شہری علاقوں میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ کیزا موسم برسات میں زرعی اجناس کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے حملے سے نقصان شدہ غلہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے چکی کے پاٹوں سے نکلا گیا ہو۔ یہ تقریباً ایک ماہ زندہ رہتا ہے۔ سل بھر میں اس کیزے کی چار پانچ ٹیلیں ہوتی ہیں۔

انسداد:- گودا مول کو ہر ہفتہ کھول کر صاف کریں اور ہوا لگوائیں۔



19- گڑوواں

مندرجہ ذیل چار قسم کے گڑوواں نقصان پہنچاتے ہیں۔

(الف) چوٹی کا گڑوواں

(ب) تنے کا گڑوواں

(ج) جڑ کا گڑوواں

(د) گرداسپوری گڑوواں

(الف) چوٹی کا گڑوواں

یہ سفید رنگ کا کیڑا ہوتا ہے۔ موسم بہار میں کیڑے نئی فصل پر انڈے دیتے ہیں۔ انڈے نرم سرے والی شاخوں کے پتوں پر دیئے جاتے ہیں۔

سنڈیاں تنے کے اوپر سے داخل ہو کر گودا کھا جاتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں درمیانی کونٹل سوکھ جاتی ہے۔

موسم سرما میں کونٹل کے بالائی حصے میں چھپ جاتا ہے۔

انسداد:- 13 اونس اینڈرین 100 گیلن پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔

(ب) تنے کا گڑوواں

موسم بہار میں نئی فصل پر انڈے دیتے ہیں۔ سنڈیاں تنے کے بیرونی حصے سے داخل ہو کر گودا کھاتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں درمیان سے شاخ سوکھ جاتی ہے۔

موسم خزاں کے شروع میں یہ کیڑا سنڈی کی حالت میں فصل کی منڈھوں میں داخل ہو جاتا ہے۔

انسداد:- 13 اونس اینڈرین 100 گیلن پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔

(ج) جڑ کا گڑوواں

اس کیڑے کے پروانے منڈھوں سے نکل کر پودے کے نچلے حصے یا پھر زمین میں انڈے دیتے ہیں۔

سنڈیاں جڑ کی طرف سے اوپر دو تین پوریوں میں داخل ہو کر گودا کھا جاتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں پودا کمزور ہو جاتا ہے۔

(د) گرد اسپوری گڑواں

اس کیڑے کا رنگ خیلا بھورا ہوتا ہے۔ اگلے پروں کے کناروں پر گہرے رنگ کے دھبے پائے جاتے ہیں۔ پچھلے پر اگلے پروں کے مقابلے میں قدرے سفید ہوتے ہیں۔ سنڈی کا رنگ ہلکا بوائی مگر سر کا رنگ ہلکا نارنجی ہوتا ہے۔ سنڈی کی پشت پر بھورے رنگ کی دھاری ہوتی ہیں۔

گرد اسپوری گڑواں کے حملہ کے سبب فصل دھتہ روگ کا شکار بھی ہو جاتی ہے۔

ماہ 100 سے 300 تک انڈے دیتی ہے۔ ایک ہفتہ کے دوران انڈوں سے سنڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

سنڈی کا شدید حملہ جون سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔ حملے کی صورت میں فصل جلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

20۔ گلابی سنڈی

پروانے کا رنگ زردی مائل بھورا ہوتا ہے۔ سر باریک بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ پچھلے پروں کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ اگلے پروں کے سروں پر باریک بالوں کی جھالر ہوتی ہے۔ حملہ شدہ پھول کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے حملے سے پودوں پر نسواری یا سیاہ رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ کیڑے کا پروانہ گہرے بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ گلابی سنڈی تازہ آگے ہوئی شاخوں پر حملہ نہیں کرتی۔

یہ سنڈی پودوں کے نازک حصوں سے رس چوستی ہے۔ جس سے پھل بہت متاثر ہوتا ہے۔ جب تنے میں سوراخ کر کے داخل ہوتی ہے تو درمیانی پھوٹی ہوئی شاخ کی نشوونما رک جاتی ہے۔ یہ سنڈی موسم سرما کیپس کے بیج کے اندر گزارتی ہے۔ جب نئی فصل پر انڈے دیتی ہیں تو ان سے تین سے سات دنوں تک سنڈیاں پیدا ہوتی ہیں جو ٹینڈوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ لور بیج کھانا شروع کر دیتی ہے۔

انڈے سے نکلنے وقت سنڈی کا رنگ ہلکا زردی مائل ہوتا ہے۔ جب سنڈی تقریباً 2.5 سینٹی میٹر لمبی ہو جاتی ہے تو اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے سنڈی کے حملے کا زیادہ زور جولائی سے نومبر تک ہوتا ہے۔ ماہ تقریباً 75 سفید لیوترے انڈے دیتی ہے۔ جو گہرے بھورے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

انسداد:- فصل بونے سے پہلے چھ کو دو تین روز تیز دھوپ میں رکھیں۔

ایڈرین 19 اونس، ڈیڑھ پونڈ 75 فیصد ڈی ڈی ٹی میں ملا کر اسپرے کریں۔ یا 15 اونس میلا تھیان 100 گیلن پانی میں ملا کر اسپرے کریں چھ کے گوداموں میں ای ڈی سی ٹی کے زہریلے بخارات چھوڑیں تا کہ کیڑے ختم ہو جائیں۔


21۔ گندم کی بھونڈی

یہ ایک سبز رنگ کا رس چوسنے والا کیڑا ہے۔ موسم بہار کے شروع میں بڑی تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ اس کی پہلی دو تین نسلیں بے پر ہوتی ہیں۔ پھر مکمل پردار کیڑے بن جاتے ہیں یہ کیڑے انڈوں کی بجائے بچے دیتے ہیں۔ آگتی ہوئی فصل کو چٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کیڑا کھانا کم مگر نقصان زیادہ کرتا ہے دن کے وقت یہ کیڑے زمین میں چھپے رہتے ہیں سنڈی کی حالت میں فصل کی جڑوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ حملہ شدہ پتے اور خاص کو چوٹی کے چوں پر یہ کیڑے اکٹھے ملتے ہیں ایسے چوں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایسے پودوں کو پھل اور پھول نہیں نکلتے۔ گندم کی بھونڈی کا اکتوبر سے نصف دسمبر تک فصل پر شدید حملہ ہوتا ہے۔

انسداد:- 10 اونس ایڈرین 100 گیلن پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔ یا 8 اونس ڈائیٹرکراں 100 گیلن پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔ بی ایچ سی 12 فیصد 20 کلو گرام لیکر مٹی میں ملا کر کھیت میں بکھیر دیں۔

22۔ گن۔ م کی سری

ہلخ کیڑے کا رنگ میلا سفید، جسم سلنڈر نما ہوتا ہے۔ سر قدرے نیچے کو جھکا ہوا اور ہلکی بھوری مونچھوں کا سرا موٹا اور سر شاخہ ہوتا ہے۔ اس کا انڈہ سفید اور کچھ عرصہ کے بعد گلابی ہو جاتا ہے۔ انڈا لمبوتر اور مخروطی شکل کا ہوتا ہے مادہ سری 300 سے 400 تک انڈے دیتی ہے۔ گرب کا رنگ زردی مائل سفید اور پیٹ پچکا ہوا ہوتا ہے کویا کا رنگ زردی مائل سفید اور جسم پر باریک بل ہوتے ہیں۔



یہ کیڑا زیادہ تر گندم کا دشمن ہے۔ مادہ دانوں پر انڈے دیتی ہے۔ لاروا جب انڈے سے باہر نکلتا ہے تو بڑا سا سورخ بنا کر دانے کے اندر گھس جاتا ہے۔ وہاں ہی یہ جوان ہوتا ہے اور پھر باہر نکل کر دوسرے دانوں پر حملہ کرتا ہے۔ مکئی، چاول، جوار، جو اور دیگر ذخیرہ شدہ خوردنی اجناس یا ان سے بنی ہوئی اشیاء کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ کیڑا پردار اور گرب دونوں حالتوں میں دانے کے نشاستہ پر گزارہ کرتا ہے۔ سنڈی زیادہ تر دانے کے اندرونی حصہ کو کھاتی ہے۔ اور پردار سری دانوں کو آنے کی طرح باریک کر دیتی ہے۔ یہ سری کھاتی کم مگر نقصان زیادہ کرتی ہے اور مارچ سے نومبر تک نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ اس کی سل میں 5 نسلیں ہوتی ہیں۔

23۔ گھوڑا مکھی

اس کا بھورا رنگ خشک گھاس کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بچے تقریباً ایک سینٹی میٹر دھماگے جیسے ہوتے ہیں۔ پردار کیڑے اور ان کے بچے دونوں ہی پتوں سے رس چوستے ہیں۔ گھوڑا مکھی ایک پسندار مادہ خارج کرتی ہے۔ جو پتوں پر گر کر سیاہ پھپھوندی پیدا کرتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں پتے بد نما ہو جاتے ہیں۔ مادہ موسم بہار میں پتوں کی سطح کے نیچے تقریباً 20 انڈے دیتی ہے۔ جو کہ سفید خول میں ڈھکے ہوتے ہیں۔ انڈوں سے بچے سات دن سے دس دن کے اندر نکل آتے ہیں۔ یہ کیڑا مکاؤ کی فصل کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ مکاؤ کے علاوہ مکئی اور جوار کی فصل بھی زخمی آتی ہے۔

انسداد: خیتوں میں سوکھے پتوں کو اکٹھا کر کے مٹھوں پر ڈالیں اور جلادیں دو سال سے زیادہ موڑھا کھو نہیں رکھنا چاہیے۔

فصل پر 300 گرام ایندزین 450 لیٹر پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔

24۔ لشکری سنڈی

یہ سنڈیاں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فوج کے لشکر کی طرح یلغار کرتی ہیں لشکری سنڈی کے لشکر: ب نمودار ہوتے ہیں تو زمین پر چلتے ہیں۔ راستے میں جو سبز پتوں والی فصل آئے اس کے پتے چٹ کر جاتے ہیں۔ ایک کھیت کو تباہ کر کے دوسرے کھیت میں پہنچ جاتی ہیں۔ کیڑا موسم سرما منڈھوں میں گزارتا ہے۔ مارچ میں پروانے نکل کر تنوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور گودا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں درمیانی شاخ خشک ہو جاتی ہے۔ لشکری سنڈی عموماً رات کو حملہ کرتی ہے۔ بڑے پودوں کے تنوں اور خوشوں کو کاٹ دیتی ہے۔

سنڈیاں چھوٹے اور نرم پودوں کے تنے کاٹ کر پتوں کا مکمل صفایا کر دیتی ہیں۔


انسداد:۔ کھیت کے گرد کھائیاں کھود دیں۔ اس طرح سنڈیاں اس میں گر جائیں گی اور بعد میں دبا دیں۔

اینڈزین 19 اونس 100 گیلن پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔

یا 12 اونس ڈیپرکس 100 گیلن پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔

25۔ مکئی اور جوار کا گڑھواں

مکئی اور جوار کی فصلوں پر مکئی جسم کے کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ نقصان رساں مکئی اور جوار کا گڑھواں ہے۔ جو پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں جہاں مکئی اور جوار کاشت کی جاتی ہے۔ بکثرت پایا جاتا ہے۔ یہ کیڑا موسم سرما منڈھوں میں گزارتا ہے۔ شاخ میں پروانے نکل کر انڈے دیتے ہیں۔ جن سے سنڈیاں نکل کر تنوں میں داخل ہو کر گودا کھانا شروع کر دیتی ہیں۔



کیڑے کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔ اگلے پر خشک گھاس کی مانند اور ان پر ہلکے سیاہ رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ پچھلے پر ہلکے سفید ہوتے ہیں۔ یہ گڑواں مکئی اور جوار کے چارے کی نسبت ابلج کی فصل کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ مکئی کے پودے پر جڑوں کے سوا تمام حصوں پر حملہ کرتا ہے۔ یہ پتوں اور بھٹوں کو کھاتا ہے اور تنے میں داخل ہو کر اسے کمزور کرتا ہے۔

انسداد:- کاشت کے وقت بیج کے ساتھ نیو راؤٹن بحساب اپونڈیا ٹھیٹھ 2 پونڈ فی ایکڑ سیاڑوں میں ڈالیں۔ ایک ماہ بعد فیور اؤٹن بحساب 1 پونڈ فی ایکڑ کو نہلوں پر ڈالیں۔ بعد ازاں پانی دے دیں تاکہ زمین پر گرا ہوا زہریلائی میں حل ہو کر پودے میں جڑوں کے ذریعے جذب ہو جائے۔

26- سبز تیلہ

بچے کی شکل نکونی ہوتی ہے۔ اس سبز رنگ کے کیڑے کے پر زرد ہوتے ہیں۔ اگلے پر کے اوپر ایک کالا دھبہ ہوتا ہے۔ جون کے مینے میں فصل کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ جس سے پتے بھورے رنگ کے اور سطح غیر ہموار ہو جاتی ہے۔ یہ کثیر تعداد میں جمع ہو کر پودوں پتوں 'نرم شنیوں اور پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ مکئی کے نئے بننے سے پہلے پودوں پر حملہ کرتا ہے۔ خصوصاً پتے کو چلی سطح سے چوستا ہے۔ جس سے پتوں پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔ یہی داغ بعد میں سرخی مائل رنگت اختیار کر لیتے ہیں۔ پتے کے کنارے چلی طرف مڑ جاتے ہیں سبز تیلہ سخت گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔

میتھا میڈ و فاس

پانی میں ملا کر جولا کی سے قبل اسپرے کریں۔

27- سفید تیتلا

بچے کی شکل بیضوی ہوتی ہے۔ اس کا رنگ ہلکا زردی مائل ہوتا ہے۔ اس کے پروں کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ جسم پر ہلکا سا چمکانا مادہ محسوس ہوتا ہے۔

اس کے جسم سے ایک ایسا دار مادہ خارج ہوتا ہے جو پتوں پر سیاہ رنگ کی پھپھوندی پیدا کرتا ہے۔ سفید تیتلا بھی سبز تیتلا کی طرح فصل کو نقصان پہنچاتا ہے۔

28- ست تیتلا

ست تیتلا کی بت سی اقسام ہیں۔ مشہور قسم کا رنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے۔ یہ پودے کے مختلف حصوں پر بیٹھ کر رس چوستے ہیں۔ جس سے پودا اور سٹہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ شدید حملے کی صورت میں بیج سٹکڑ جاتے ہیں۔ اس کے جسم سے ایک خاص قسم کا مادہ نکلتا ہے جو پتوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اس کا شدید حملہ مارچ اپریل میں ہوتا ہے۔ خصوصاً آلو کی فصل میں دائرس کی بیماریاں پھیلاتا ہے۔

کیڑا آلو، ٹماٹر، گوبھی، مولی، شلجم اور پیٹنگن کا سخت دشمن ہے۔

انسداد:- 50 فیصد میلا تھیان آدھا لیٹرنی ایکڑ اسپرے کریں۔

29- چست تیتلا

یہ سفید سبزی مائل کیڑا ہے۔ جس کے اگلے پروں اور سر کی چوٹی پر سیاہ داغ ہوتے ہیں افزائش نسل اپریل سے دسمبر تک رہتی ہے۔ یہ کیڑا فصل کے تنے اور پتوں پر بیٹھ کر ان کا رس چوستا ہے۔ خصوصاً پتوں کی چلی سطح سے رس چوستا ہے۔ جس سے پودا کمزور اور پتے سفید مائل داغ دار ہو جاتے ہیں بعد میں یہ داغ سرخ ہو جاتے ہیں پتوں کے کنارے مڑ جاتے ہیں۔ اور فصل پیلی پڑ جاتے ہیں۔

یہ لیز انڈر 'بھنڈی توری' بیگن 'گدو اور تربوز کا سخت دشمن ہے۔

انسداد:- نوگاس 250 ملی گرام فی ایکڑ اسپرے کریں۔

30- سفید مکھی

سفید مکھی کا رنگ پیلا، پر سفید اور قد تقریباً 1.5 ملی میٹر ہوتا ہے۔

سفید مکھی خصوصاً پتوں کا رس چوستی ہے۔ اور وائرس کی بیماریاں پھیلاتی ہے۔ شدید حملے کی صورت میں پودوں کی نشوونما

رک جاتی ہے مادہ پتوں کے نیچے انڈے دیتی ہے سبب بھر میں بارہ نسلیں ہوتی ہیں۔

انسداد:- ایک لٹری میلا تھیان 100 لیٹر پانی میں ملا کر اسپرے کریں۔

(II) اہم سبزیوں کے نقصان دہ کیڑے

(Familiarization With Insect-Pests of major vegetables)

اہم سبزیوں	نقصان دہ کیڑے
1- شلجم	لٹکری سنڈی 'ست نیلہ' بگ۔
2- مول	لٹکری سنڈی 'ست نیلہ' بگ۔
3- آلو	آلو کا پروانہ 'سبز بھونڈی' 'سبز نیلہ' 'چست نیلہ' 'تنے کی سنڈی' 'سفید مکھی' 'چور کیڑا'۔
4- ٹماٹر	پھل کی سنڈی 'چور سنڈی' 'سفید مکھی' 'ست نیلہ' 'چست نیلہ'
5- پیاز	تھرپ۔
6- کریلے	سفید مکھی 'لٹکری سنڈی' 'چور کیڑا' 'پھل کی مکھی'۔
7- مینڈا	چست نیلہ 'سفید مکھی' 'جوئیں' 'ست نیلہ'
8- بند گوبھی	گوبھی کی تیزی 'نیلہ' 'گوبھی کی سنڈی' 'مولی بگ'۔
9- مٹر	مٹر کی سنڈی 'چول میں سرنگیں بنانے والی مکھی'۔
10- بھنڈی	چست نیلہ 'بھنڈی کی دھبے دار سنڈی' 'سفید مکھی' 'چور کیڑا' 'لٹکری سنڈی' 'چنکبری سنڈی'۔
11- مرچ	تھرپ 'چور کیڑا' 'سفید مکھی' 'ویک'۔

III- اہم فصلوں اور سبزیوں کے نقصان دہ کیڑے اکٹھے کرنا

(Collection of insect-pests of major crops & vegetables)

محفوظ شدہ کیڑے بشرطیکہ انہیں پوری احتیاط سے محفوظ کیا گیا ہو موثر تدریسی معجون ہیں۔ مدرسے کے گرد و نواح میں کھیتوں سے حاصل ہونے والے کیڑوں کا الہم نہ صرف مدرسے کے طالب علموں بلکہ علاقے کے کسانوں کے لئے بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ عام طور پر کسان فصلوں کو نقصان پہنچانے والے سب کیڑوں کے متعلق واقفیت نہیں رکھتے۔ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ کچھ کیڑے اور سونڈیاں ان کی فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں مگر ان کے نام انہیں بہت کم یاد ہوتے ہیں۔

ایک اچھے الہم کی تیاری سے بچے ان کیڑوں کے اودار حیات، خصوصیات اور علوات کے متعلق بہت کچھ جان لیں گے۔ کپاس کے کھلے ہوئے ٹینڈوں میں جو سرخ یا بھورے رنگ کی بھونڈیاں ملتی ہیں انہیں پال کر ان کی زندگی کا مشاہدہ کر کے معلومات اپنی بھی نوٹ بک میں ریکارڈ کریں۔

مندرجہ ذیل کیڑوں کے منہ کاغذ سے مشاہدہ کریں اور معلومات کو اپنی عملی نوٹ بک میں ریکارڈ کریں۔

(الف) گندم کی سری

(ب) کپاس کی سنڈی

(ج) گوبھی کی سنڈی

IV- اہم فصلوں کی بیماریاں

(Diseases of Major Crops)

اہم فصلیں	بیماریاں
1- گندم	کھلی کاٹھیری، اکھیرا، نکلی، سفوف دار پھپھوندی، مٹی۔
2- چاول	تھنے کا سڑاؤ، بھبکا، چوں کا جھلساؤ۔
3- گنا	کاٹھیری، رتا روگ، چٹکیری۔
4- کپاس	جز سڑن، تزک، پودے کا جھلساؤ، کپاس کا اکھیرا۔
5- تمباکو	موزیک، مرعھاؤ۔
6- مکی	تھنے کا سڑاؤ، چوں کا جھلساؤ، کاٹھیری۔
7- باجرا	کاٹھیری، تھنے کا سڑاؤ۔
8- چنا	چنے کا جھلساؤ، چنے کا مرعھاؤ۔

۷۔ اہم سبزیوں کی بیماریاں

(Diseases of Major vegetables)

بیماریاں	اہم سبزیوں
پتوں پر پھپھوندی دھبے۔	1۔ فلیجم
پتوں پر پھپھوندی دھبے۔	2۔ مولی
بجھینا جھلساؤ، آگیتا جھلساؤ، مرجھاؤ، بڑ کے گانٹھ دار خٹیفے، آلو کی پتہ لپیٹ وائرس، آلو کی چری۔	3۔ آلو
جھلساؤ، مرجھاؤ، اکھیرا، وائرس موزیک۔	4۔ ٹماٹر
پیاز کی روئیس دار پھپھوند، پودے کی گردن کی سڑن۔	5۔ پیاز
اکھیرا، مرجھاؤ، بڑ کے گانٹھ دار خٹیفے۔	6۔ کرلیے
اکھیرا، مرجھاؤ، روئیس دار پھپھوند، سفوف دار پھپھوند۔	7۔ ٹینڈہ
روئیس دار پھپھوند، اکھیرا، مرجھاؤ، پتوں پر پھپھوندی دھبے۔	8۔ بند گوبھی
سفوف دار پھپھوند، اکھیرا، مرجھاؤ، جھلساؤ۔	9۔ مٹر
بڑ اور تنے کی سڑن۔	10۔ بھنڈی
بشر مردگی، اکھیرا۔	11۔ مرچ

(VI) فصلوں کے نقصان دہ کیڑوں اور بیماریوں کا مختلف طریقوں سے کنٹرول

(Controlling Insect Pests of Crops & Diseases by Different Method)

انسان ہمیشہ اپنی محنت کا پھل چاہتا ہے لیکن یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہر سال کاشتکار کی محنت کا تقریباً 20 فیصدی حصہ نقصان دہ کیڑے مکوڑوں اور مڈیوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ لیکن زرعی سائنس نے جہاں زراعت کو بے پناہ آسائیاں بخشی ہیں وہاں تحفظ نباتات کیلئے سینکڑوں ادویات اور طریق ہائے تحفظ رائج کئے ہیں۔ مثلاً جب اچانک پکی ہوئی فصلوں پر مڈی دل حملہ آور ہوتی ہے تو پہلی کاپڑ اور دیگر مڈی مار جہاز حرکت میں لانے سے مڈی دل کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔

کیڑوں اور بیماریوں پر بروقت توجہ دی جائے تو کافی حد تک ان کے نقصان سے بچا جاسکتا ہے فصلوں اور سبزیوں کو کیڑوں اور بیماریوں سے بچانے کے لئے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ اگر کھیت میں بیماری یا کسی کیڑے کا حملہ ہو تو فوراً "زراعت آفسر سے رجوع کریں اور اس کی ہدایت پر عمل کریں۔

- 1- بیماریوں اور کیڑے سے پاک سدرست اور تصدیق شدہ بیج استعمال کرنا چاہیے۔
- 2- بیج کو 50 درجہ سینٹی گریڈ گرم پانی میں تقریباً دو تین منٹ بھگو کر دھوپ میں خشک کریں اس طرح کافی حد تک کئی بیماریوں پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
- 3- فصل جتنی زیادہ گھنی ہوگی بیماری یا کیڑوں کے حملہ کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے لہذا سبزیوں کو مناسب فاصلہ پر لگانا چاہیے۔
- 4- جب کسی فصل پر بیماری یا کسی کیڑے کا حملہ ہو تو پھر اسی خاندان کی دوسری سبزی اس کھیت میں کاشت نہ کریں۔
- 5- فصلوں کی ایسی اقسام کاشت کریں جن میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پائی جاتی ہو۔
- 6- وائرس پھیلانے والے کیڑوں کی مناسب کیڑے مار دوائی سے تلفی کریں۔
- 7- بیماری یا کیڑے مکوڑوں سے متاثرہ پودوں کو نکال باہر پھینکیں۔ بلکہ آگ کر تلف کر دینا چاہیے۔ تاکہ

بیماری کے جراثیم کھل طور پر ختم ہو جائیں۔

8- دوا چھڑکنے کے بعد کم از کم دس دن تک کھیت سے حاصل کردہ سبزی فروخت نہ کریں اور نہ ہی استعمال

کریں۔ سبزیوں کو کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں سے بچانے کے لئے ایسی ادویات استعمال میں لانی چاہیں جن کا انسانی

صحت پر برا اثر نہ پڑتا ہو۔

(XI) سبزیوں کے بیج اکٹھے کرنا

(Collecting Vegetable Seeds)

عملی کلیم: موسم گرما اور موسم سرما کی سبزیوں کے بیجوں کو پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے لفافوں میں اکٹھا کر کے عملی نوٹ بک میں سبزیوں کے ناموں کی اندراج کے ساتھ چسپاں کریں۔

کیڑوں اور بیماریوں پر بروقت توجہ دی جائے تو کافی حد تک ان کے نقصان سے بچا جاسکتا ہے۔ فصلوں اور سبزیوں کو کیڑے اور بیماریوں سے بچانے کے لئے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کرنی چاہیں اگر کھیت میں بیماری یا کسی کیڑے کا حملہ ہو تو فوراً "زراعت آفسر سے رجوع کریں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔

فصل کاٹنے کے بعد جو جڑیں وغیرہ باقی بچتی ہیں انہیں مشینوں کی مدد سے زمین میں بست مگر ادا دیا جاسکتا ہے اس طرح فصل کے کیڑے مکوڑوں اور ہائاتی امراض کے پھونٹنے کا خطرہ لاحق نہیں رہتا۔

ہدایات برائے اساتذہ

- 1- طلباء کو اسکول کے باغیچہ اور قرنیہ کھیتوں میں کاشت کی مٹی بزیوں کی فصلیں دکھائیں۔
- 2- بزیوں کی تجویز کردہ ترقی دادہ اقسام کی پہچان کرائیں۔
- 3- ان بزیوں کی کاشت کے دوران جو اوزار وغیرہ استعمال کئے گئے ہیں وہ بھی طلباء کو دکھائے اور سمجھائے جائیں۔
- 4- کسی موٹی بزی کو اسکول کے باغیچے میں کاشت کر کے دکھائیں۔

انشائیہ سوالات

- 1- نقصان دہ کیڑوں سے کیا مراد ہے؟ نقصان دہ کیڑے فصلوں کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں؟
- 2- گندم، دھان اور کپاس کی دو دو مشہور بیماریوں کے نام تحریر کریں۔ نیز ان بیماریوں کا مناسب تدارک کیسے کیا جاتا ہے؟
- 3- (الف) مختلف فصلوں کو نقصان پہنچانے والے پانچ مشہور کیڑوں کے نام تحریر کریں۔ نیز ان کیڑوں کی پہچان کیسے کریں گے؟
- (ب) فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کا مناسب تدارک کیسے کیا جاسکتا ہے؟
- 4- نقصان دہ کیڑوں کی روک تھام کس طرح کی جاسکتی ہے؟
- 5- پودوں کی مندرجہ ذیل بیماریوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
- (الف) کانٹاری
- (ب) سبکی
- (ج) رتا روگ
- 6- کپاس کی سونڈی فصل کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہے؟
- 7- (الف) دیمک ہمیں کیونکر نقصان پہنچاتی ہے؟
- (ب) آپ فصلوں کو دیمک سے کیسے بچائیں گے؟
- 8- مکلو کی فصل کے مشہور کیڑوں اور بیماریوں کے نام لکھیں اور ہر ایک کا مناسب تدارک کیسے کیا جاسکتا ہے؟
- 10- مندرجہ ذیل پر مفصل نوٹ لکھیں:
- (الف) دھان کا گڑوواں
- (ب) چنے کا جھلساؤ
- (ج) کپاس کی پتنگبری سنڈی

معروضی سوالات

مندرجہ ذیل بیانات کے بعد قبلہ جواہت "A, B, C اور D" دیئے گئے ہیں جو بیان کو مکمل کرتے ہیں۔
مقررہ جگہ پر موزوں ترین جواب لکھیے:

1- تنے کی سنڈی کے بچوں کا رنگ:

(A) زردی مائل سفید (B) گہرا بنبر

(C) تھورا سیاہ (D) ہلکا سرخ

2- سراور سینے کا رنگ بھورا ہوتا ہے۔ چوڑے رخ دو سیاہ رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ پودوں کو کھاتے کم ہیں
مگر کٹ کر نقصان زیادہ کرتے ہیں۔

(A) چور کیرے (B) دھان کے تنے کی سنڈی

(D) فوجی کترے

3- اگلے پروں کا رنگ نارنجی زرد ہوتا ہے جن کے درمیان ایک سیاہ داغ ہوتا ہے پروانے زردی مائل سفید
نکے ہوتے ہیں۔ سنڈیاں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں۔

(A) دھان کے تنے کی سنڈی (B) دھان کی بھونڈی

(C) چور کیرا (D) فوجی کترے

4- گلابی سنڈی کے پروانے کا رنگ۔

(A) زردی مائل بھورا (B) گلاب کے پھول کی طرح

(C) سفید (D) سیاہ

5۔ اس کی پہلی دو تین نسلیں بے پر ہوتی ہیں۔ پھر مکمل پروار کیڑے بن جاتی ہیں۔ یہ کیڑے انڈوں کی بجائے بچے دیتے ہیں۔ دن کے وقت یہ سرے زمین میں چھپے رہتے ہیں۔ پودوں کو کھاتے کم محرکات کر نقصان زیادہ کرتے ہیں۔

(B) گندم کی سری

(A) گندم کی بھونڈی

(D) لٹکری سنڈی

(C) گھوڑا کھی



(I) ذیل میں دیے گئے کالم I کے اندراجات کا کالم II کے کن اندراجات سے تعلق ہے کالم I کے جس نمبر کا کالم II سی تعلق ہے وہ نمبر مقررہ جگہ پر درج کریں۔

جدول (I)

نمبر شمار	کالم (I)	کالم (II)
1-	سیدھے پروالا کیرا	(A) کھٹل
2-	جالی دار پروالا کیرا	(B) کپاس کی سنڈی
3-	نخت پروالا کیرا	(C) سری
4-	پردار پروالا کیرا	(D) نیلا
5-	نصف پروالا کیرا	(E) ٹوکا

(II) جدول

نمبر شمار	کالم (I)	کالم (II)
1-	جوؤں کی طرح چھوٹا سا کیزا۔ رنگ سیاہ۔	(A) گلابی سنڈی
	ملوہ پتوں کی رگوں میں انڈے دیتی ہے۔	
	رس چوس کر پتے کی رنگت زرد کر دیتی ہے۔	
2-	اگلے پر سفیدی مائل زرد۔ پروں پر سبز رنگ	(B) دیمک
	کی دھاریاں۔ سینے کے اگلے حصے پر تاریخی	
	رنگ کے نشان۔ باقی حصے پر ہلکے ہلکے ہلے۔	
3-	چیونٹی کی مانند چھوٹی سی زرد اور سفید رنگ	(C) چٹکبری سنڈی
	کی سنڈی۔ عام طور پر زمین دو زگھروں میں	
	رہتی ہے۔ اس کا خاندان رانی 'بادشاہ' کارکن	
	محافظ اور معاونین پر مشتمل ہوتا ہے۔	
4-	سرباریک بالوں سے ڈھکا ہوا۔ پروانے کا رنگ	(D) قھرپ
	زردی مائل بھورا۔ پچھلے پروں کا رنگ سفید۔	
	اگلے پروں کے سروں پر باریک بالوں کی جھال۔	
	حملہ شدہ پھول کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح	
	ہو جاتا ہے۔	

(II) درج ذیل میں سے صحیح فقرات کے سامنے نشان "✓" اور غلط فقرات کے سامنے نشان "X" لگائیے۔

- 1- پتہ لپیٹ سنڈی سردیوں کے موسم میں کپاس کی فصل پر انڈے دیتی ہے۔
- 2- تنے کی سنڈی کے بچوں کا رنگ زردی مائل سفید ہوتا ہے۔
- 3- دھان کا پتنگا ایک ایسا پردار کیڑا ہے جس کا رنگ بھورا اور پروں کے کناروں کے ساتھ باریک جھار ہوتی ہے۔
- 4- سفید تیل کے جسم سے ایک لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے جو پروں پر سیاہ رنگ کی پھپھوندی پیدا کرتا ہے۔
- 5- لشکری سنڈی فوج کے لشکر کی طرح یلغار کرتی ہے۔

مندرجہ ذیل بیانات کی خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کیجئے:

- 1- کھرے کی سنڈی کچھ کھائے پئے بغیر تقریباً _____ سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔
- 2- تنے کی سنڈی کے سر کا رنگ _____ ہوتا ہے اور پروں کا رنگ خشک گھاس کی طرح ہوتا ہے۔
- 3- بچے کا دھورا _____ رنگ کا ہوتا ہے۔ پیٹ کا سرانگا اور لمبی مہنچیں ہوتی ہیں۔
- 4- کپاس کے تنے کی سنڈی کے انڈے _____ رنگ کے ہوتے ہیں۔
- 5- گلابی سنڈی کے پروانے کا رنگ _____ ہوتا ہے۔

شیٹ: 2

کام کی نوعیت

فصلوں کے ضرر رساں کیڑوں کی تلفی سکول سے ملحقہ کھیت میں جا کر کسی فصل کے پودوں پر موجود سنڈی کو کیڑے پکڑنے والی جالی کی مدد سے پکڑ کر اس کی شناخت کیجئے اور اپنی عملی نوٹ بک میں اسکی شکل بنائیں۔

اس سنڈی کو تلف کرنے کیلئے آپ کیا اقدامات تجویز کریں گے؟

نوٹ بک میں اسکی شکل بنائیں اس سنڈی کو تلف کرنے کیلئے آپ کیا اقدامات تجویز کریں گے؟

تاریخ _____

فصل کا نام _____

سنڈی کا نام _____

سنڈی کی شکل:

انسداد کے لئے اقدامات: _____
